

**Таблица 2.** Выбор высокотехнологичного метода лечения развернутых стадий БП.

	Глубокая стимуляция мозга с помощью имплантированных электродов	Инфузия геля леводопа/карбидопа с помощью дуоденальной помпы	Инфузия апоморфина с помощью подкожной помпы
Наличие отчетливых периодов «выключения»	++	++	++
Возраст >70 (75) лет	–	+	0
Выраженные дискинезии	++	+	0
Сопутствующие заболевания	–	+	–
Выраженные речевые расстройства	–	+	+
Постуральная неустойчивость	–	0	0
Психотические нарушения, галлюцинации	–	+	–
Нарушения импульсного контроля	+	+	–
Дневная сонливость	0	0	–
Расстройства ночного сна	+	+	+
Легкая деменция	–	0	0
Умеренная и тяжелая деменция	–	–	–
Умеренная и тяжелая депрессия	–	+	0
Апатия	–	+	+
Тревога	+	+	–
Суицидальные попытки в анамнезе	–	0	0
Дисфагия, дизартрия	–	+	+
Потеря веса	–	0	0
Боль	+	+	+
Синдром беспокойных ног	–	+	+
Резистентный тремор	++	–	–
Ортостатическая гипотензия	0	0	–
Пациент не определился с решением	–	0	+

Пациент хочет быть более независимым	+	0	0
Отсутствие социальной поддержки	0	-	-

*Примечание к таблице:* + означает факторы, благоприятствующие в пользу выбора данного метода лечения; 0 означает факторы, не влияющие на выбор данного метода лечения; – означает факторы, препятствующие выбору данного метода лечения.